

ПАМЯТКА

1. Что делать, если вас эвакуируют в пункт временного размещения

при прогнозе наводнения:

- взять только необходимые вещи и документы;
- не брать скоропортящиеся продукты питания;
- не брать матрацы, подушки, толстые одеяла;
- взять аптечку первой помощи и лекарства, которыми вы обычно пользуетесь;
- при наличии признаков инфекционных заболеваний (повышение температура, тошнота, рвота, жидкий стул, боли в горле и др.) необходимо немедленно об этом сообщить медицинскому работнику по прибытию в ПВР;
- при нахождении в ПВР соблюдать правила личной гигиены, мыть руки после посещения туалета и обязательно перед едой, пользоваться индивидуальным полотенцем;
- не покупать продукты питания в неустановленных местах, старайтесь питаться только в столовой ПВР;
- проводить ежедневный самоосмотр на наличие педикулеза.

2. Лицам ответственным за содержанием ПВР:

Организовать медицинский осмотр лиц, поступающих на ПВР в целях исключения инфекционных больных;

- изолировать и госпитализировать в инфекционную больницу (отделение) лиц, с признаками инфекционных заболеваний;
- не допускать использование собственных постельных принадлежностей (матрацы, подушки, толстые одеяла);
- осуществлять контроль за санитарным содержанием помещений и территорий;
- осуществлять ежедневную влажную уборку помещений, туалетов с использованием дезинфицирующих средств;
- с целью профилактики возникновения массовых инфекционных заболеваний исключить из меню эпидемиологически опасные блюда – омлеты, термически не обработанные молочные продукты, колбасу, овощи, воду;
- обеспечить работу бактерицидных облучателей рециркуляторного типа в помещениях, с массовым постоянным пребыванием людей;
- обеспечить ежедневную дезинфекцию надворных туалетов;
- использовать для организации питьевого режима воду гарантированного качества.

3. После возвращения домой при спаде воды необходимо помнить:

- попавшие в воду продукты питания категорически запрещается применять в пищу;
- попавшие в зону затопления колодцы с питьевой водой необходимо осушить для их последующей дезинфекции;
- при появлении признаков инфекционных заболеваний немедленно вызвать врача на дом.